

Projet d'introduction de Sayana Press

Évaluation post-formation — GUIDE DE CORRECTION

Nom : _____ Date : _____

Région : _____ District : _____

Questions	Points
<p>Pour les questions 1 à 6, cochez toutes les réponses correctes. Plusieurs réponses peuvent être correctes pour certaines questions. Si vous ne connaissez pas la bonne réponse, ne répondez pas à la question. (Les réponses correctes à chaque question sont imprimées en caractères gras.)</p>	
<p>1. Sayana Press prévient la grossesse chez les femmes pendant une période de</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 6 mois <input checked="" type="checkbox"/> 3 mois (1 point) <input type="checkbox"/> 1 mois seulement 	1
<p>2. Quels sont les effets secondaires courants de Sayana Press ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Maux de tête (1 point) <input checked="" type="checkbox"/> Prise de poids (1 point) <input checked="" type="checkbox"/> Changements d'humeur et de la libido (1 point) <input type="checkbox"/> Stérilité après usage à long terme <input checked="" type="checkbox"/> Règles peu fréquentes ou absence de règles (1 point) <input type="checkbox"/> Anomalies congénitales ou fausse-couche si la femme est enceinte <p>(Total possible de 4 points)</p>	4
<p>3. À qui faut-il déconseiller Sayana Press ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants <input type="checkbox"/> Aux fumeuses <input type="checkbox"/> Aux femmes qui allaitent <input checked="" type="checkbox"/> Aux femmes atteintes d'hypertension (1 point) <input checked="" type="checkbox"/> Aux femmes présentant des antécédents de crise cardiaque ou d'AVC (1 point) <input checked="" type="checkbox"/> Aux femmes souffrant de migraines (1 point) <p>(Total possible de 3 points)</p>	3
<p>4. Quels sont les points d'injection de Sayana Press ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Abdomen (1 point) <input checked="" type="checkbox"/> Dos du bras (1 point) <input type="checkbox"/> Fesses <input checked="" type="checkbox"/> Devant de la cuisse (1 point) <input type="checkbox"/> Muscle deltoïde du bras <p>(Total possible de 3 points)</p>	3
<p>5. Après une injection de Sayana Press, il convient de</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reboucher l'aiguille avant de la jeter dans le récipient pour objets tranchants <input checked="" type="checkbox"/> Ne pas reboucher l'aiguille et la jeter immédiatement dans le récipient pour objets tranchants (1 point) 	1
<p>6. Quand convient-il de réinjecter Sayana Press à une cliente sans exclure d'abord l'existence d'une grossesse ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Quand la cliente revient se faire injecter avec 2 semaines d'avance (1 point) <input checked="" type="checkbox"/> Quand la cliente revient se faire injecter avec 2 semaines de retard (1 point) 	3

<input type="checkbox"/> Quand la cliente revient se faire injecter avec 4 semaines de retard (1 point)			
<input type="checkbox"/> Quand la cliente revient se faire injecter avec 6 semaines de retard (Total possible de 3 points)			
Pour les questions 7 à 10, écrivez la réponse correcte dans l'espace laissé blanc.			
7.	Votre cliente se présente à la réinjection avec plus de 4 semaines de retard mais elle n'est pas enceinte. Vous lui administrez Sayana Press et vous lui conseillez d'utiliser une autre méthode pendant _____ (nombre) jours pour éviter de se retrouver enceinte. Réponse correcte : 7 (1 point)	1	
8.	Après combien de semaines faut-il prévoir le retour d'une cliente pour la réinjection de Sayana Press ? Réponse correcte : 13 semaines (1 point)	1	
9.	L'effet secondaire qui amène le plus souvent les femmes à abandonner l'injectable est : Réponse correcte : Le changement des règles ou leur absence (1 point)	1	
Pour les questions 11 à 16, entourez la réponse correcte (Vrai ou Faux).			
10. Vrai / Faux	Le préservatif est la seule méthode qui protège à la fois contre la grossesse et le VIH. (1 point)	1	
11. Vrai / Faux	Depo IM et Sayana Press se composent du même médicament actif et offrent la même efficacité contraceptive. (1 point)	1	
12. Vrai / Faux	Il est acceptable pour une cliente qui a reçu Depo IM à sa dernière injection de recevoir Sayana Press lors de sa prochaine injection. (1 point)	1	
13. Vrai / Faux	Après l'arrêt de Sayana Press, le retour à la fécondité peut prendre un certain temps mais la plupart des femmes peuvent concevoir environ 10 à 12 mois après leur dernière injection. (1 point)	1	
14. Vrai / Faux	Si le prestataire voit un peu de médicament liquide restant dans le réservoir, l'injection ne sera pas efficace. (1 point) Ce n'est pas grave si un peu de liquide reste dans le réservoir.	1	
15. Vrai / Faux	Les femmes qui allaitent peuvent utiliser Sayana Press sans risques quand leur enfant a au moins 6 semaines. (1 point)	1	
16. Vrai / Faux	Une cliente ne doit être conseillée qu'avant la première injection de Sayana Press. (1 point) Les clientes doivent être conseillées à chaque injection.	1	
Une note de 80 % ou mieux est recommandée, soit un minimum de 20 réponses correctes sur un total possible de 25 points.		Note totale	25
		Total possible	25
		Pourcentage	100 %

Comment calculer la note :

Inscrivez le nombre de points obtenus pour chaque question dans la colonne de points à droite de la question. Remarquez que plusieurs questions valent plus d'un point et que la candidate peut obtenir une note partielle suivant le nombre de réponses correctes cochées. Inscrivez la note totale de l'évaluation post-formation sur la ligne correspondante et calculez le pourcentage par rapport au total possible de 25 points. Une note de 80 % ou mieux est recommandée.