

## Projet d'introduction de Sayana Press

### Évaluation post-formation

Nom : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Région : \_\_\_\_\_ District : \_\_\_\_\_

| Questions   | Points |
|---|--------|
| <b>Pour les questions 1 à 6, cochez toutes les réponses correctes. Plusieurs réponses peuvent être correctes pour certaines questions. Si vous ne connaissez pas la bonne réponse, ne répondez pas à la question.</b>   |        |
| 1. Sayana Press prévient la grossesse chez les femmes pendant une période de<br><input type="checkbox"/> 6 mois<br><input type="checkbox"/> 3 mois<br><input type="checkbox"/> 1 mois seulement   |        |
| 2. Quels sont les effets secondaires courants de Sayana Press ?<br><input type="checkbox"/> Maux de tête<br><input type="checkbox"/> Prise de poids<br><input type="checkbox"/> Changements d'humeur et de la libido<br><input type="checkbox"/> Stérilité après usage à long terme<br><input type="checkbox"/> Règles peu fréquentes ou absence de règles<br><input type="checkbox"/> Anomalies congénitales ou fausse-couche si la femme est enceinte |        |
| 3. À qui faut-il déconseiller Sayana Press ?<br><input type="checkbox"/> Aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants<br><input type="checkbox"/> Aux fumeuses<br><input type="checkbox"/> Aux femmes qui allaitent<br><input type="checkbox"/> Aux femmes atteintes d'hypertension<br><input type="checkbox"/> Aux femmes présentant des antécédents de crise cardiaque ou d'AVC<br><input type="checkbox"/> Aux femmes souffrant de migraines            |        |
| 4. Quels sont les points d'injection de Sayana Press ?<br><input type="checkbox"/> Abdomen<br><input type="checkbox"/> Dos du bras<br><input type="checkbox"/> Fesses<br><input type="checkbox"/> Devant de la cuisse<br><input type="checkbox"/> Muscle deltoïde du bras   |        |
| 5. Après une injection de Sayana Press, il convient de<br><input type="checkbox"/> Reboucher l'aiguille avant de la jeter dans le récipient pour objets tranchants<br><input type="checkbox"/> Ne pas reboucher l'aiguille et la jeter immédiatement dans le récipient pour objets tranchants   |        |

|   |                        |
|---|------------------------|
| 6. Quand convient-il de réinjecter Sayana Press à une cliente sans exclure d'abord l'existence d'une grossesse ?  |                        |
| <input type="checkbox"/> Quand la cliente revient se faire injecter avec 2 semaines d'avance<br><input type="checkbox"/> Quand la cliente revient se faire injecter avec 2 semaines de retard<br><input type="checkbox"/> Quand la cliente revient se faire injecter avec 4 semaines de retard<br><input type="checkbox"/> Quand la cliente revient se faire injecter avec 6 semaines de retard |                        |
| <b>Pour les questions 7 à 9, écrivez la réponse correcte dans l'espace laissé blanc.</b>  |                        |
| 7. Votre cliente se présente à la réinjection avec plus de 4 semaines de retard mais elle n'est pas enceinte. Vous lui administrez Sayana Press et vous lui conseillez d'utiliser une autre méthode pendant _____ (nombre) jours pour éviter de se retrouver enceinte.  |                        |
| 8. Après combien de semaines faut-il prévoir le retour d'une cliente pour la réinjection de Sayana Press ?<br>_____   |                        |
| 9. L'effet secondaire qui amène le plus souvent les femmes à abandonner l'injectable est :<br>_____   |                        |
| <b>Pour les questions 10 à 16, entourez la réponse correcte (Vrai ou Faux).</b>   |                        |
| 10. Vrai / Faux      Le préservatif est la seule méthode qui protège à la fois contre la grossesse et le VIH.   |                        |
| 11. Vrai / Faux      Depo IM et Sayana Press se composent du même médicament actif et offrent la même efficacité contraceptive.   |                        |
| 12. Vrai / Faux      Il est acceptable pour une cliente qui a reçu Depo IM à sa dernière injection de recevoir Sayana Press lors de sa prochaine injection.   |                        |
| 13. Vrai / Faux      Après l'arrêt de Sayana Press, le retour à la fécondité peut prendre un certain temps mais la plupart des femmes peuvent concevoir environ 10 à 12 mois après leur dernière injection.   |                        |
| 14. Vrai / Faux      Si le prestataire voit un peu de médicament liquide restant dans le réservoir, l'injection ne sera pas efficace.   |                        |
| 15. Vrai / Faux      Les femmes qui allaitent peuvent utiliser Sayana Press sans risques quand leur enfant a au moins 6 semaines.   |                        |
| 16. Vrai / Faux      Une cliente ne doit être conseillée qu'avant la première injection de Sayana Press.  |                        |
|   | Note totale            |
|   | Total possible      25 |
|   | Pourcentage            |